

KOMPLET ZA GOJENJE

Bukov Ostigar (Pleurotus Ostreatus)

V vrečo kompleta na mestih z največ beline oz. micelija z razkuženim olfa nožem ali škarjami zarežete dve luknji v dolžini od 3-5 cm. Luknji naj bosta toliko narazen, da bosta lahko skozi njih izraščala istočasno dva šopka ostrigarjev. Ko naredite luknji, odvečen zrak iz vreče zgoraj iztisnete in zgornji del vreče trdno zalepite na spodnji del, tako da dobimo kompaktno tvorbo brez zračnih žepov. S tem dosežemo, da gobe izraščajo na mestih, kjer smo naredili luknje. Če substrat odpremo preveč, lahko pride do prekomerne izgube vlage, izsuševanja in zavrtja rasti.



POGOJI ZA GOJENJE

Vlaga: 85%-90%

Temperatura: 13 - 21 °C pri manj kot 13 °C bodo gobe rasle izredno počasi, pri več kot 20 °C pa bodo rastle hitreje, a bodo klobuki bolj bledi in pusti

Svetloba: indirektna sončna svetloba ali umetna svetloba (12 ur luč, 12 ur tema)

Kisik: ostrigarji za pravilno rast potrebujejo precej kisika, v nasprotnem primeru se jim razvijejo dolgi, dolgi beti in majhni klobučki, zato je zračenje izrednega pomena. Potreba po svežem zraku je povezana tudi s temperaturo; pri višjih temperaturah, ko gobe hitreje rastejo, bodo potrebovale več svežega zraka, kot pri nižjih.

OKOLJE

Če doma nimamo prostora s primerno temperaturo, vlago in zračnostjo (npr. klet) tako okolje v dnevnem prostoru najlažje ustvarimo z večjo prozorno škatlo ali zabojem, nenazadnje tudi prozorno vrečo, kjer na dno namestimo plitvo posodo ali pladenj z vodo ali še bolje – pladenj z namočenim perlitom/vermikulitom/glinenimi kroglicami, ki bo oddajal vlago, škatla oz. vreča pa jo bo zadrževala. Vlažnost lahko pomagamo vzdrževati tudi s pršilko z vodo, s katero večkrat dnevno oz. po potrebi pršimo po notranjosti škatle/vreče. Ko gobe postanejo opazne s prostim očesom, pazimo, da ne pršimo direktno po njih, ker ni dobro, da se na njih stalno zadržuje voda, saj lahko na teh mestih pride do bakterijske okužbe.

Če imamo gobe v prozorni škatli/zaboju v prostoru, moramo večkrat dnevno (3-6x) poskrbeti za izmenjavo notranjega zraka (zadošča par zamahov z smetišnico). Notranjost se bo sproti zračila, če bomo v ohišje oz. vrečo naredili nekaj lukenj, ali pa pokrov malo zamaknili. Več kot bo lukenj, boljše bo zračenje, a težje vzdrževanje visoke vlage. V kolikor bi želeli svoj postopek za odtenek avtomatizirati, pa lahko kompletu vlaženje zagotovite s preprostim vlažilcem, zračenje.

OBIRANJE

Ostrigarje praviloma pobiramo pri stopnji, ko se rob klobuka največje gobe v šopu poravnata. Če se več gob viha navzgor, jih nemudoma pobremo. Odrtgamo cel šop naenkrat, ne posameznih gob. Drugi obrod se bo pojavil na istem mestu, če smo odtrgali cel šop, tako da je bilo zraven še malo substrata oz. da spodnji deli betov niso ostali na substratu. Če na substratu ostane "stara goba", lahko ob naslednjem obrodu na tem mestu pride do gnitja, zato dvakrat preverimo, če smo res odtrgali vse. Pričakujemo lahko 2 do 4 valov obrodov. Substrat lahko po uporabi zakopljemo na vrt ali v kompostnik, saj pospešuje proces kompostiranja.

Želimo vam obilo uspeha pri gojenju gob.

Hiša Gob, Jure Gradišnik s.p.
Jezero 23a, 8210 Trebnje
040/57 44 88